

Insectos xilófagos

Sociales

Ciclo Larvario (carcomas)

Termitas subterráneas (*Reticulitermes spp*):
Parecidas a “gusanitos”
Blanquecinos, movimientos “frenéticos”. Salida de voladoras negras por primavera aprox.

Termitas aéreas

***Cryptotermes brevis*:**
“Parecidas a “gusanitos”
Salida de voladoras castañas entre la primavera y el verano aprox.

Carcomas grandes (Cerambícidos):
Gusano grande dentro de la madera o “escarabajo” alargado con grandes antenas, fuera de ella

Carcomas pequeñas:
Gusanito dentro de la madera o pequeño “escarabajo” redondo fuera.

Síntomas:
Madera hueca, galerías dispuestas en forma de “peinado” con “barro seco” pegado (forma orgánica). Conductos o canales de “barro” en pared o maderas. Horadan el yeso. Papeles y cartones comidos (parecen Podridos).

***Kaloterms flavicollis*:**
“Parecidas a “gusanitos”
Pero de mayor tamaño
Salida de voladoras negras con mancha amarilla en el dorso, en otoño aprox.

Síntomas:
Madera hueca, con galerías repletas de diminutas bolas fecales (parecidas a granos de café). Hacen agujeros circulares semejantes a los de las carcomas. Gusta de madera húmeda.

Síntomas:
Madera hueca, con Galerías muy limpias y lisas, aunque con diminutas bolas fecales (parecidas a granos de café). Hacen agujeros circulares semejantes a los de las carcomas. Come madera seca y húmeda

Síntomas:
Agujeros ovalados en la madera, llenan sus galerías de un finísimo serrín. A veces se ensañan con una determinada viga o elemento. cuando comen, pueden llegar a ser Audibles por El oído humano

Síntomas:
Agujeros redondos en la madera de 2 mm aprox, suelen caer montoncitos de serrín. Con el buen tiempo, es común encontrar adultos en ventanas y cortinas.

Fuente:

it ibertrac
DES DE 1977

CONTROL DE PLAGUES